

ОТЗЫВ НА АФТОРЕФЕРАТ

диссертации Дегтярёва Евгения Николаевича на тему: «Предикторы осложнений беременности, родов и анестезиологического обеспечения у первородящих юного возраста» представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по научной специальности 14.01.20 – анестезиология и реаниматология и по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология

Диссертационная работа Дегтярёва Евгения Николаевича посвящена решению актуальной проблеме акушерской анестезиологии – анестезиологического обеспечения родов у первородящих юного возраста, а также разработке подходов для прогнозирования и профилактики жизнеугрожающих осложнений. Актуальность поднятой в диссертационном исследовании проблемы подтверждается высокой частотой осложнений беременности и родов у данного контингента, а также отсутствием исследований, посвященных разработке прогностических маркёров жизнеугрожающих состояний во время беременности и родов. В современных систематических обзорах и мета-анализах встречаются данные о различных эффектах тревоги на течение беременности и родов, однако не определена роль тревоги в развитии осложнений у первородящих юного возраста. В Кохрейновской базе данных систематических обзоров, проведенных за последние 10 лет, показана необходимость определения влияния различных доз окситоцина, вводимых во время операции кесарева сечения с целью профилактики гипотонических кровотечений у женщин юного возраста, на развитие осложнений. Поэтому оценка роли влияния юного возраста имеет важную теоретическую и практическую значимость.

На основе анализа клинико-статистических показателей проведенной работы, представлены результаты проспективных исследований: способа постановки эпидурального катетера с расширением эпидурального пространства во время проведения анестезиологического пособия у первородящих юного возраста, позволяющего уменьшить риск непреднамеренной канюляции эпидуральных вен, уровня тревоги накануне операции кесарева сечения, имеющего прямую корреляционную связь с содержанием альфа-амилазы в слюне, о влиянии различных доз окситоцина, вводимых с целью профилактики развития гипотонических кровотечений во время операции кесарева сечения у первородящих юного возраста, на развитие осложнений анестезиологического обеспечения, уровня альфа-амилазы слюны, ассоциированного с развитием интраоперационной артериальной гипотонии во время спинальной анестезии при операции кесарева сечения.

Все полученные данные исследования достаточно и правильно обработаны с использованием параметрических и непараметрических методов сравнения, и выявлена их достоверность.

Подпись _____
Начальник Управления
и правового
ФГБОУ ВПО «Удмуртский